

定期予防接種の種類と接種方法（乳幼児）

令和7年4月現在

ワクチン	対象疾病	接種対象年齢		標準的な接種年齢	方法			
五種混合ワクチン	ジフテリア	生後2月に達した時から生後90月に達するまで	第1期初回	生後2月から生後12月までの間に、20～56日までの間隔で3回接種	皮下接種又は筋肉内接種			
	百日ぜき							
	破傷風		第1期追加	初回接種終了後12月から18月までの間に1回接種				
	急性灰白髄炎（ポリオ）							
	ヒブ感染症							
四種混合ワクチン	ジフテリア	生後2月に達した時から生後90月に至るまで	第1期初回	生後2月から生後12月までの間に、20～56日までの間隔で3回接種	皮下接種			
	百日ぜき							
	破傷風		第1期追加	初回接種終了後12月から18月までの間に1回接種				
	急性灰白髄炎（ポリオ）							
ヒブワクチン	ヒブ感染症	接種開始時期 生後2月から生後7月に至るまで	初回	生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種	皮下接種			
			追加	初回接種終了後7月以上の間隔を置いて1回接種				
		接種開始時期 生後7月から生後12月に至るまで	初回	生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種				
			追加	初回接種終了後7月以上の間隔を置いて1回接種				
		接種開始時期 生後12月から生後60月に至るまで		1回接種				
		15価肺炎球菌結合ワクチン又は 20価肺炎球菌結合ワクチン	小児肺炎球菌感染症	接種開始時期 生後2月から生後7月に至るまで		初回	生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種	皮下接種又は筋肉内接種
追加	初回接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12月以降に1回接種							
接種開始時期 生後7月から生後12月に至るまで	初回			生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種				
	追加			初回接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12月以降に1回接種				
接種開始時期 生後12月から生後24月に至るまで				60日以上の間隔を置いて2回接種				
接種開始時期 生後24月から生後60月に至るまで				1回接種				
B型肝炎ワクチン	B型肝炎			1歳に至るまでの間	初回	生後2月から9月の間に27日以上の間隔で2回接種	皮下接種	
					追加	1回目の接種から139日以上の間隔を置いて1回接種		
ロタリックス	ロタウイルス感染症	生後6週～24週まで	1回目	生後2月に至った日から出生14週6日まで	経口接種			
ロタテック			2回目	1回目から27日以上あけて生後24週まで				
			3回目	（ロタテックのみ）2回目から27日以上あけて生後32週まで				
BCGワクチン	結核	1歳に至るまでの間		生後5月～生後8月末までに1回接種	経皮接種			
麻しん風しん（MR）ワクチン	麻しん・風しん	生後12月から生後24月に至るまでの間	1回目	1回接種	皮下接種			
		5歳以上7歳未満	2回目	小学校就学前の1年間4月1日から3月31日までに1回接種				
水痘ワクチン	水痘	生後12月から生後36月に至るまで	1回目	生後12月から生後15月末までに至るまでの間に1回接種	皮下接種			
			2回目	1回目接種後6月から12月までの間隔を置いて1回接種				
日本脳炎ワクチン	日本脳炎	生後6月から生後90月に至るまでの間	第1期初回	3歳から4歳未満で6～28日間隔で2回接種	皮下接種			
			第1期追加	1期初回接種終了後、1年経過した時期に1回接種				